

GLOBI fer[®]

a vasszint optimalizálása



RÁGÓTABLETTA
GLOBIfer[®] egy innovatív formula, amely a vérszegénység tüneteit mutató kutyák és macskák számára ajánlott.

KOMPLEX FORMULA

A **Vas** hozzájárul az általános fizikai fejlődéshez, serkentheti az immunitást és enyhítheti a fáradtságot.

A **B-vitaminok** létfontosságú funkciókat látnak el az állati szervezetben. A C-vitaminnal együtt szinergikusan hatnak a vörösvértestek normális képződésére.

A **laktoferrin** szabályozza a vasszintet és az immunválaszt.

A **Réz** növekedésserkentőként használatos, mivel nélkülözhetetlen a hemoglobin bioszintéziséhez.

A **Cink** aktívan részt vesz a normál sejtfunkciókban.

Esszenciális aminosavak: a komplex aminosav formula anabolikus hatású, újjáépíti az izomtömeget és az enzimszisztémát.

Kálium fontos ásványi anyag a szervezet sav-bázis egyensúlyjának fenntartásában.

A **rozmaryn kivonat** olyan természetes anyagokat tartalmaz, amelyek javítják a vérkeringést.

ALKALMAZÁS

Naponta egyszer, szájon át


macskák

kutyák

1/4 tablettát
5 kg-nál kisebb
súly esetén.

1 tablettát/10 kg
testtömeg

1/2 tablettát
5 kg
feletti súly esetén.



JAVALLAT

A növényi kivonatok, ásványi anyagok és vitaminok kombinációja révén a **GlobiFER®** enyhítheti a vérszegénység tüneteit.

- az emésztési tolerancia és a vas felszívódásának javítása;
- a vérképzés (a vérelemek: vörösvértestek, leukociták és vérlemezkék képződésének folyamata) normális működése;
- a vércsontvelő aktivitásának támogatása;
- támogathatja a vörösvérsejtek, a hemoglobin normális képződését a szervezetben;
- cisztein, homocisztein, fehérjék és glikogén normál szintézise;

DL-Metionin 10 mg

L-Fenilalanin 10 mg

L-Taurin 10 mg

L-Treonin 10 mg

Arginin 10 mg

L-Leucin 10 mg

Izoleucin 10 mg

L-valin 10 mg

L-hisztidin 10 mg



Vas 6 mg

Laktoferrin 10 mg

Réz 1 mg

Cink 2 mg

Kálium 78 mg

L-lizin 100 mg

**B Vitamin
komplex** 50 mg

**Standardizált rozmaring
kivonat** 20 mg

FIGYELMEZTETÉSEK

Ne lépje túl az ajánlott napi adagot.

A termék alkalmazása vagy használatának meghosszabbítása előtt konzultáljon állatorvosával, mivel az állat egyéni tüneteitől függően változhat az adagolás vagy a használat módja.